

A. — Mouvement de la production au Maroc

I. — Conditions naturelles

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DU TROISIEME TRIMESTRE 1948

Températures

STATIONS	MOYENNE DES MAXIMA						MOYENNE DES MINIMA					
	JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE		JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE	
	Normal	1948	Normal	1948	Normal	1948	Normal	1948	Normal	1948	Normal	1948
Agadir	26,5	25,4	27,2	25,8	25,8	25,6	17,4	18,1	17,7	17,8	17,4	16,2
Taroudant	40,0	36,6	37,5	39,0	34,5	34,7	15,9	17,1	16,7	18,3	15,1	14,7
Casablanca	26,5	26,3	27,4	27,2	26,8	26,3	17,8	19,9	18,3	19,2	16,7	17,9
Mazagan	27,3	27,9	27,8	27,8	27,0	26,9	16,4	16,0	16,8	16,2	15,3	14,6
Settat	-	-	33,9	-	31,1	-	16,1	12,8	16,9	13,9	15,1	14,7
Kasba-Tadla	40,3	41,2	40,6	-	34,9	35,8	19,8	20,1	20,1	-	17,2	16,4
Fès	35,8	37,1	35,8	37,3	31,7	33,5	17,7	18,2	18,4	18,1	16,0	16,7
Marrakech	38,5	39,6	38,4	39,6	33,4	34,7	18,8	20,8	19,6	20,9	17,2	17,8
Safi	29,7	29,8	30,9	30,1	28,3	27,8	20,3	18,4	21,1	17,2	19,5	15,9
Mogador	21,6	20,9	21,7	21,0	22,0	23,0	17,4	16,9	16,8	16,8	16,6	16,7
Meknès	33,9	33,8	34,3	35,7	30,1	32,7	15,6	14,7	12,6	14,6	14,7	12,9
Ifrane	30,5	31,6	30,0	31,8	24,9	27,2	11,0	11,4	11,5	12,2	8,6	9,2
Azrou	32,4	36,1	32,9	35,9	28,4	31,3	17,3	18,9	17,8	19,1	14,6	16,0
Oujda	34,2	34,0	34,4	36,1	30,3	32,4	16,3	16,7	17,6	17,6	15,0	14,3
Berkane	32,5	31,8	33,4	33,6	29,8	31,0	19,1	17,3	19,9	18,5	17,7	16,9
Rabat	27,5	27,0	28,4	27,0	27,0	26,1	17,0	16,8	17,7	16,1	16,3	16,3
Port-Lyautey ...	31,7	30,3	32,5	30,6	30,5	29,5	15,4	17,5	17,0	16,8	14,6	15,6

PRECIPITATIONS

Total du 3^{me} trimestre 1948

STATIONS	Hauteur en m/m		Nombre de jours de pluie
	normal	1948	
Agadir	1	—	—
Taroudant ...	5	—	—
Casablanca ...	6	—	—
Mazagan	7	2	1
Settat	9	—	—
Kasba-Tadla ..	20	1	2
Fès	16	2	2
Marrakech ...	17	8	1
Safi	4	—	—
Mogador	3	—	—
Meknès	16	3	2
Ifrane	—	29	13
Azrou	55	32	4
Oujda	31	7	3
Berkane	28	—	—
Rabat	11	—	—
Port-Lyautey ..	15	0,3	1

Les températures constatées au cours du 3^{me} trimestre ont, dans l'ensemble, été légèrement inférieures à la moyenne sur le littoral et, plus nettement, supérieures à celle-ci dans l'intérieur. Les précipitations sont, pour la même période, sensiblement au-dessous de la normale. Il s'agit bien d'un été chaud et sec.

2. — Production agricole

La situation agricole au Maroc

(3^{me} TRIMESTRE 1948)

Comme à l'habitude, ce trimestre a été caractérisé par une sécheresse généralisée et par des températures élevées, accompagnées de fréquents coups de sirocco et de chergui. Ces conditions climatiques ont eu leurs répercussions sur les cultures en terre, telles que la vigne — qui a été sérieusement affectée dans certaines zones, telles que celles de Rabat-Port-Lyautey. Les parcours ont continué à se dessécher et les ressources en eau, non à se tarir, mais à se réduire ; heureusement, les chaumes apportent un appoint sérieux à la nourriture des troupeaux.

La moisson a été lente, en raison de la chaleur qui interdisait les travaux une partie de

la journée, de la verse provoquée par les pluies tardives, de l'insuffisance des carburants et de l'exode des ouvriers, alléchés par les prix énormes offerts par les fellah céréaliculteurs. On connaît les résultats de la récolte qui, satisfaisante en orge et en avoine, moyenne pour le blé dur, a été déficitaire pour le blé tendre, dont les disponibilités ne permettront pas d'assurer les besoins de la consommation, qui devront être couverts par l'importation.

Les rendements des légumineuses ont été moyens, bons dans certaines régions, surtout en pois, faibles dans d'autres, notamment pour les pois chiches malgré leur très beau départ, et cela du fait de l'échaudage, qui a frappé également le sorgho. Par contre, le maïs a donné d'assez bons résultats. Les oléagineux ont, dans l'ensemble, donné satisfaction, mais auraient pu être meilleurs si les semis avaient été plus précoces. Le coton est de belle venue, mais subit les dégâts des parasites.

La vendange, qui a commencé normalement, ne sera pas abondante, en raison de la grêle qui a détruit en partie celle de Meknès, du mildiou et de l'oïdium sur la côte, et du sirocco.

Les agrumes promettent une belle récolte, sauf les clémentiniers et les mandariniers, et malgré la présence de quelques parasites.

Les faibles rendements en olives se confirment ; réduits dans le Nord par une floraison défectueuse et, dans le Sud — où elle avait été très belle — par des brouillards et des vents qui l'ont tardivement comprise et gêné la nouaison. En outre, le scolyte a causé des dommages dans les oliviers manquant d'eau.

Le bétail, en très bon état au début du trimestre, commence évidemment à baisser, à la fin de septembre, par suite du dessèchement des parcours et de la disparition progressive des chaumes, sauf dans les bas-fonds humides ou en montagne. Le manque d'eau commence à se faire sentir dans certaines régions.

On signale, en août, avec une régression des piroplasmes, une assez large extension du charbon bactérien (Rabat, Mazagan) et du charbon symptomatique (Marrakech), qui sont combattus par des vaccinations massives. La peste aviaire semble en voie de disparition. Les marchés sont bien approvisionnés, tout au moins en ovins, mais la production laitière commence à diminuer.

E. M.