Températures moyennes. — Dans l'ensemble, ces températures sont inférieures aux normales de —  $0^{\circ}2$  à —  $1^{\circ}$ , sauf dans quelques ilots, aux environs de Mogador, Casablanca, Rabat, Guercif, Berkane, où les écarts positifs sont de l'ordre de +  $0^{\circ}3$  à +  $0^{\circ}8$ .

Températures maxima moyennes. — Elles sont inférieures aux températures normales sur tout le territoire ; les écarts varient de —  $0^{\circ}2$  à —  $2^{\circ}$ .

Températures minima moyennes. — Ces températures sont supérieures aux normales sur les plaines du Maroc

Occidental et Oriental ; écarts de + 0°4 à + 1°8, inférieures aux normales sur le relief : de - 0°5 à - 2°.

Précipitations. — Les situations orageuses ont été nombreuses sur le relief, mais les précipitations n'ont été importantes que sur le Haut-Atlas central, où on localise un maximum de 106 mm dans la vallée de la Zaouïa Ahansal. Sur le Moyen-Atlas, apparaît un maximum moins important, avec 44 mm à Boulemane. Les hauts plateaux algéro-marocains ont enregistré de 10 à 30 mm; le Sarhro de 10 à 20; le Rif et les plaines, des quantités négligeables.

## 2° SITUATION AGRICOLE

# Evolution de la situation agricole au cours du 4<sup>me</sup> trimestre de la campagne agricole 1954-1955

#### Climatologie

Le régime d'été s'est maintenu au cours du trimestre. La température diurne a été relativement élevée; du chergui a été signalé au début de juillet, vers le 7 août, entre le 13 et le 15 août et à plusieurs reprises au mois de septembre.

La température nocturne a baissé en septembre, surtout en fin de mois.

Quelques orages ont été signalés en montagne pendant les mois d'août et septembre.

Le niveau des oueds était à l'étiage ; le niveau de la nappe phréatique a baissé, ainsi que le débit des sources.

#### Céréales et légumineuses de grande culture

Les dépiquages des céréales d'automne ont été terminés fin juillet, début août. La relative médiocrité de la récolte a été confirmée. En fin de campagne, les estimations de récolte étaient de 5.500.000 qx pour le blé dur, 4 millions de qx pour le blé tendre et 12.500.000 qx pour l'orge.

Le chergui de juin a également éprouvé les cultures de maïs et de sorgho.

Dans le Gharb, la récolte du riz a commencé au mois d'août; les rendements paraissent assez satisfaisants, bien qu'inférieurs à ceux de la précédente campagne puisque la production de 300.000 qx ne serait pas dépassée malgré l'accroissement des superficies à 7.300 ha.

En ce qui concerne les légumineuses de printemps, la récolte des haricots serait légèrement inférieure à la moyenne. Il en est de même pour les pois chiches, dont la végétation a été éprouvée par le chergui de juin.

#### Cultures industrielles

La récolte du *lin* a été terminée fin juin, début juillet; les rendements ont été moyens dans le Rharb, inférieurs à la moyenne dans les autres régions.

Dans la région de Meknès, la récolte des betteraves sucrières était achevée au début août. La moyenne des rendements était de 11 tonnes à l'hectare.

Dans le Tadla, la récolte du *coton* est en cours et s'annonce moyenne.

#### Cultures maraîchères

Tomates. — On a procédé pendant tout le trimestre à la cueillette des tomates de saison. Les repiquages de tomates d'automne ont été effectués dans de bonnes conditions et la production a commencé en septembre. En fin de trimestre, les semis de primeur ont commencé sur la côte et leur superficie semble approximativement égale à celle de la campagne précédente.

Pommes de terre. — La récolte des pommes de terre de saison s'est poursuivie pendant tout le trimestre. En août, les plantations de pommes de terre d'automne ont débuté et les plus précoces présentaient une belle végétation, à la fin de septembre.

Divers. — Les récoltes de melons et de pastèques ont été effectuées pendant l'été. Les rendements ont été satisfaisants

En septembre, il a été procédé aux semis et aux repiquages des légumes d'hiver.

#### Arboriculture fruitière

Agrumes. — La nouaison s'est effectuée dans de bonnes conditions au début du trimestre et la végétation a évolué normalement.

La récolte sera supérieure à celle de la campagne écoulée; les premières clémentines sont apparues sur le marché à la fin de septembre.

Autres arbres fruitiers. — La récolte des pêches et des prunes s'est poursuivie en juillet-août. Celle des pommes, poires se poursuit. La récolte des amandes en seç est terminée; la production a été assez faible.

#### Oléiculture

L'élévation brusque de température et le chergui du début de juillet ont amené la chute de jeunes fruits. La récolte paraît, suivant les secteurs, très irrégulière et nettement inférieure à celle de la campagne écoulée. Les premières cueillettes d'olives en vert ont commencé en septembre.

#### Viticulture

La récolte a commencé vers le 15 août et se poursuivait encore dans certaines régions à la fin de septembre.

A l'exception de la région d'Oujda, la récolte est bonne en quantité et en qualité. Dans la région de Fès, elle est même supérieure de 20 % à la récolte précédente.

Dans la région d'Oujda, au contraire, l'attaque de mildiou signalée en juin, a entraîné une diminution de 50 % et la récolte ne dépassera guère 150.000 hl.

Dans l'ensemble la production de vin sera légèrement supérieure à celle de 1954.

#### Situation économique

Les agriculteurs ont été en général déçus par les rendements et la faible qualité des céréales. Les demandes de prêt et de report d'échéance sont très nombreuses, ce qui témoigne de sérieuses difficultés de trésorerie.

En milieu marocain, les fellahs ont surtout besoin d'avances de semences; en milieu européen la tendance semble être d'effectuer les cultures aussi économiquement que possible.

# Situation de l'élevage au cours du 3<sup>me</sup> trimestre 1955

Le cheptel marocain a, dans son ensemble, bien supporté la chaleur d'un été qui n'a pas connu de longues périodes de chergui.

Les chaumes abondants en plaine, la végétation spontanée en montagne et en forêt, ont assuré aux troupeaux une subsistance d'abord copieuse, puis peu à peu raréfiée. En fin de trimestre, les bovins ont baissé d'état, et les réserves fourragères, trop souvent bien réduites, sont nécessaires au bon entretien du gros bétail, jusqu'à l'apparition toujours aléatoire des pâturages d'automne.

Bien que l'été soit peu favorable aux importations d'animaux, les éleveurs ont introduit au Maroc :

- 362 bovins de races laitières dont 276 hollandaises,
   66 montbéliardes et 20 danoises, ainsi que :
- 3 verrats de race Large White.
- 24.400 poussins d'un jour ont été reçus par voie aérienne.

Les concours de primes, organisés comme chaque année dans les centres d'élevage, pour encourager les meilleurs producteurs des différentes espèces domestiques, ont été parfois gênés par les événements politiques et n'ont pas connu leur succès habituel. Ils n'en ont pas moins donné lieu à d'honorables présentations.

La situation sanitaire du cheptel n'a pas causé d'inquiétude. — Grâce à des interventions prophylactiques étendues, les risques d'épizooties graves sont de plus en plus limités.

La clavelée se manifeste peu en été. 17 foyers peu importants ont cependant été reconnus, et 33.800 moutons vaccinés.

- Le charbon bactéridien a été signalé à vingt-six reprises, avec la perte de 78 bovins, 127 ovins, 17 caprins et 3 porcs.
  - Les vaccinations ont porté sur 170.880 animaux.
- Le charbon symptômatique, de plus en plus rare en raison des vaccinations préventives, a toutefois entraîné la mort de 123 bovins. Dans la circonscription de Port-Lyautey, 65.564 bovins ont été vaccinés.
- La dourine devient plus fréquente avec la fin de la saison de monte. Sur 37 animaux atteints, 3 sont morts, 24 juments ont été abattues par mesure sanitaire, 10 chevaux ou baudets ont été castrés. Un secours a été attribué aux éleveurs frappés par la décision d'abattage.
- La rage a été diagnostiquée à soixante-cinq reprises, sur 48 chiens, 1 chat, 1 chacal, 5 ânes, 8 bovins et 2 ovins.
   La destruction des chiens errants devrait être intensifiée.
- Les piroplasmoses, en recrudescence sensible avec l'été et la pullulation des tiques, n'ont pas occasionné de grosses mortalités. L'arsenal thérapeutique permet de combattre chaque année plus efficacement à la fois les ixodes porteurs de virus et les hématozoaires pathogènes.
- La peste aviaire sévit à l'état endémique sur l'ensemble du pays. Avec l'accoutumance des volailles, les pertes deviennent plus supportables. 6.700 poules ont été vaccinées.
- Les infections parasitaires internes ou externes sont restées en général inapparentes sur un bétail convenablement nourri, et le plus souvent traité préventivement.

Le personnel du Service de l'Elevage a concentré son effort sur les bains parasiticides. Au cours de la campagne, 205 installations ont fonctionné sur les 223 existantes. Quelques bains n'ont pu être utilisés faute d'eau ou par suite de la situation politique troublée. 7.573.330 animaux ont été traités, contre 8 millions en 1954.

L'action sanitaire au cours du trimestre comporte en outre :

— Consultations gratuites en milieu marocain	7.653
— Vaccinations	332.392
— Traitements contre les parasites internes	1.069.787
— Castrations	10 657

Le ravitaillement en lait frais des grands centres a été assuré sans difficulté.

Les abattoirs des villes ont été plus ou moins désertés par les bouchers, mais les marchés ont toujours été convenablement pourvus en viande marocaine de bonne qualité.

Les importations et exportations de viandes sur pied ou abattues sont restées dans les limites peu importantes du trafic habituel : entrée de viandes de luxe, de bœuf et surtout de veau; sortie de quelques centaines de porcs et de moutons, principalement en direction de l'Algérie.

# 3° PRODUCTION MINIERE

### Activités de l'office chérifien des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

ET TRIMESTRE	KHOURIBGA			LOUIS-GENTIL					
	Extract. phosph. humides	Stocks en fin du trim.	Effectif ouvrier inscrit en fin de tr.	Nombre de jours ouvrables	Extract. phosph. humides	Stocks en fin de trim.	Effectif ouvrier inscrit en fin de tr.	Nombre de jours ouvrables	Total extract.
	milliers de tonnes				milliers de tonnes				milliers de tonnes
1949 - moyenne trim	581	33	8.115	75	246	118	3.555	75	827
1950 - »	740	101	8.689	73	265	208	3.246	73	1.005
1951 - »	861	58	9.735	74	291	124	3.376	74	1.150
1952 - »	801	338	8.357	74	274	192	2.357	74	1.075
1953 - »	743	154	9.561	74	210	163	2.072	74	954
1954 - »	1.002	400	9.537	74	283	37	2.364	74	1.285
1953 - 3 <sup>e</sup> trimestre	746	3	8.648	75	219	142	2.116	74	965
1953 - 4° trimestre	912	154	9.561	75	215	163	2.072	75	1.127
1954 - 1° trimestre	979	1 <i>7</i> 9	9.664	76	257	5 <i>7</i>	2.142	76	1.236
1954 - 2° trimestre	931	153	9.602	71	260	29	3.150	71	1.191
1954 - 3 <sup>e</sup> trimestre	1.007	233	9.707	75	302	67	2.247	75	1.309
1954 - 4 <sup>e</sup> trimestre	1.080	400	9.537	74	311	3 <i>7</i>	2.364	74	1.391
1955 - 1° trimestre	1.079	458	9.343	76	340	56	2.504	76	1.419
1955 - 2° trimestre	1.054	467	9.552	73	342	80	2.464	73	1.396
1955 - 3" trimestre	779	286	7.914	75	351	156	2.428	75	1.130